



Sprache: **Polnisch**

| WIEK | (w tygodniach) | niemowlęta | | małe dzieci | | dzieci | | | młodzież | | dorośli | | |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|----------------|--|---------|-------|-------|
| | | (w miesiącach) | | | | (w latach) | | | | | | | |
| | | 6 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 15-23 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-14 | 15-17 | od 18 |
| SZCZEPIENIE | | | U4 | | U6 | U7 | U7A/8 | U9 | U10 | J1 | | | |
| Tęžec | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (co 10 lat, N w razie potrzeby) ^f | | | |
| Błonica | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A (co 10 lat, N w razie potrzeby) ^f | | | |
| Krztusiec Koklusz | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | A1 | N | A2 | A ^f (N w razie potrzeby) | | | |
| Nagminne porażenie dziecięce Poliomylitis | | G1 | G2 ^a | G3 | G4 | N | | | A1 | N ^f (w razie potrzeby) | | | |
| Wirusowe zapalenie wątroby typu B | | G1 | G2 ^a | G3 | G4 | N | | | | | | | |
| Hib <i>Haemophilus influenzae typu b</i> | | G1 | G2 ^a | G3 | G4 | N | | | | | | | |
| Pneumokoki ^g | | G1 | | G2 | G3 | N | | | | S ^c | | | |
| Rotawirusy | G1 ^b | G2 | (G3) | | | | | | | | | | |
| Meningokoki Grupa serologiczna C | | | | | G1 (od 12 miesięcy) | | N | | | | | | |
| Odra | | | | | G1 | G2 | N | | | S ^d | | | |
| świnka różyczka | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | |
| Ospa wietrzna Varicella | | | | | G1 | G2 | N | | | | | | |
| Grypa Influenza | | | | | | | | | | S (co roku) | | | |
| HPV Wirusy brodawczaka ludzkiego | | | | | | | G1 ^e | G2 ^e | N ^e | | | | |

Najbliższe terminy szczepień



Gefördert durch:
 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- ### OBJAŚNIENIA
- G** PODSTAWOWE UODPORNIENIE (w postaci do 4 szczepionek częściowych G1-G4)
 - S** STANDARDOWE SZCZEPIENIE
 - A** SZCZEPIENIE PRZYPOMINAJĄCE
 - N** SZCZEPIENIE UZUPEŁNIAJĄCE (podstawowe uodpornienie wszystkich jeszcze nieszczepionych lub dokończenie niekompletnej serii szczepień)
 - U** Badanie w celu wczesnego rozpoznania
 - J** Badanie młodzieży (J1 w wieku od 12 do 14 lat)

- ^a W przypadku zastosowania szczepionki monowalentnej można zrezygnować z tej dawki.
- ^b Pierwsze szczepienie powinno nastąpić już w wieku 6 tygodni, w zależności od użytej szczepionki wymagane są 2 lub 3 dawki w odstępie co najmniej 4 tygodni.
- ^c Szczepienie jednorazowe szczepionką polisacharydową, szczepienie przypominające zalecane tylko dla określonych wskazań.
- ^d Jednorazowe szczepienie dla wszystkich osób urodzonych po roku 1970 ≥ 18 lat z niejasnym statusem szczepienia, bez szczepienia lub z tylko jednym szczepieniem w dzieciństwie. Szczególnie jedną szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce.

- ^e Standardowe szczepienie dla dziewcząt w wieku 9-13 lub 9-14 lat (w zależności od zastosowanej szczepionki), liczba dawek szczepionki patrz informacja fachowa!
- ^f Szczepienie przypominające przeciwko tężcowi i błonicy co 10 lat. Następne przypadające szczepienie przeciwko tężcowi i błonicy jednorazowo w postaci szczepionki DTaP lub w przypadku odpowiedniego wskazania w postaci szczepionki skojarzonej IPV.
- ^g Wcześnieiki otrzymują dodatkową dawkę szczepionki w wieku trzech miesięcy, tzn. razem 4 dawki.