



Sprache: Russisch

ВОЗРАСТ	(в неделях)	Новорожденные (в месяцах)			Младенцы		Дети (в годах)			Подростки	Взрослые			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	с 18	с 60	
ВАКЦИНАЦИЯ	U4		U6		U7		U7A/8		U9		U10		J1	
Столбняк		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (каждые 10 лет в случае необходимости) ^f				
Дифтерия		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (каждые 10 лет в случае необходимости) ^f				
Коклюш		G1	G2	G3	G4	N	A1	N	A2	A (в случае необходимости) ^f				
Полиомиелит		G1	G2 ^a	G3	G4	N				A1	N (в случае необходимости)			
Гепатит В		G1	G2 ^a	G3	G4	N								
Гемофильная инфекция тип b		G1	G2 ^a	G3	G4	N								
Пневмококк ^g		G1		G2	G3	N							S ^c	
Ротавирус	G1 ^b	G2	(G3)											
Менингококк Серогруппа C					G1 (C 12 месяцев)		N						S ^d	
Корь					G1	G2	N						S ^d	
Свинка Краснуха (MMR)					G1	G2	N						S ^d	
Ветряная оспа					G1	G2	N						S ^d	
Грипп												S (ежегодно)		
ВПЧ Вирусы папилломы человека							G1 ^e	G2 ^e	N ^e					

Даты следующих прививок



Gefördert durch:

 Bundesministerium für Gesundheit
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- ### ПОЯСНЕНИЯ
- G** БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (включающая до 4-х этапов G1–G4)
 - S** СТАНДАРТНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ
 - A** РЕВАКЦИНАЦИЯ
 - N** НАВЕРСТЫВАЮЩАЯ ИММУНИЗАЦИЯ (Основная иммунизация всех лиц, которые до текущего момента не были вакцинированы или завершение неполной серии прививок)
 - U** Профилактическое обследование
 - J** Обследование подростков (J1 – в возрасте 12–14 лет)

- ^a Эта доза не требуется при использовании моновалентной вакцины.
- ^b Первую вакцинацию необходимо проводить в возрасте от 6 недель. В зависимости от используемой вакцины следует ввести 2 или 3 дозы с перерывом как минимум 4 недели.
- ^c Полисахаридная вакцина вводится разово, ревакцинация рекомендована по конкретным показаниям.
- ^d Разовую вакцинацию для всех лиц, начиная с возраста 18 лет, родившихся после 1970 года, с неясным анамнезом вакцинации, а также для лиц, которые не были привиты или были привиты лишь однократно в детстве рекомендуется проводить вакциной MMR.

- ^e Стандартная прививка для девочек в возрасте от 9 до 13 или от 9 до 14 лет (в зависимости от используемой вакцины), количество доз см. информацию о препарате.
- ^f Ревакцинация против столбняка и дифтерии рекомендована каждые 10 лет. Следующую плановую вакцинацию против столбняка и дифтерии следует провести одновременно с вакцинацией против коклюша и, если требуется по конкретным показаниям, против полиомиелита.
- ^g Недоношенные дети получают дополнительную дозу вакцины в возрасте трех месяцев, т.е. всего 4 дозы.