



اگلے ٹیکوں کی تاریخیں



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

عمر	شیر خوار بچے (مہینوں میں)			چھوٹے بچے		قربیب البلوغ/ نوجوان (سالوں میں)				بالغ			
	6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-17	18 سے	60 سے
ٹیکہ			U4		U6	U7	U7A/8	U9	U10	J1			
ٹیٹینس / تشنج	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
خناق	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
کالی کھانسی پرٹائیس	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
پولیو پولیوما ایلائٹس	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
یرقان B	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
ہیپوفیلس انفلوئنزا ٹائپ بی	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
نیوموکوکس	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
روٹا وائرس	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
مینگو کوکس سیرو گروپ سی	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
خسرہ	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
جرمن خسرہ	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
چیچک	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
زکام/ فلو انفلوئنزا	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A
آیچ پی وی ہیومن ہیپیلوما وائرس	G1	G2	G1	G3	G4	N	A1	A1	N	A2	A	A	A

- 18 سال کے افراد جن کے بارے میں پتہ نہ ہو آیا کہ انکو ویکسینیشن پہلے دی گئی ہے اور جو 1970 کے بعد پیدا ہوئے تھے، جن کو ویکسینیشن نہیں دی گئی یا بچہ کی حیثیت سے انہیں صرف ایک ویکسینیشن دی گئی تھی، کو ویکسینیشن کی ایک خوراک دی جانی چاہیے۔ ترجیحی طور پر ایم آر نامی ویکسین دی جانی چاہیے۔
- سال تک ہیں انکے لیے عمومی ویکسینیشن یعنی ٹیکے (اسکا انحصار استعمال کردہ 9-14 یا 9-13 ای) ایسی لڑکیاں جن کی عمریں ویکسین پر ہے۔ ویکسین کی مختلف خوراکیوں کے بارے میں جاننے کے لیے خصوصی معلومات ملاحظہ کریں۔
- 10 سالوں پر ٹی ڈی بوسٹر ویکسینیشن دی جانی چاہیے۔ اگلی ٹی ڈی ویکسینیشن جو کہ لگائی جانی ہو اسکو ٹی ڈیپ کی شکل میں واحد خوراک کے طور پر دی جانی چاہیے یا، اگر بتایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں ٹی ڈیپ - آئی پی وی ویکسینیشن کا مجموعہ دیا جانا چاہیے۔
- قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کو 3 ماہ کی عمر میں ایک اضافی ٹیکہ لگتا ہے۔ یعنی ٹوٹل 4 ڈوز۔

- 1 مونو ویلنٹ ویکسین استعمال کرنے کی صورت میں اس خوراک کی ضرورت نہیں۔
- 2 پہلی ویکسینیشن 6 ہفتوں کی عمر سے دیجانی چاہیے۔ ویکسین کی قسم کے حساب سے، 2 یا 3 خوراکیوں کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم 4 ہفتوں کے وقفوں سے۔
- 3 پولی سیجرانڈ ویکسین کے ساتھ، اکیلی خوراک، بوسٹر ویکسینیشن کی صرف خصوصی علامات کی صورت میں پی دیے جانے کی سفارش کی جاتی ہے۔

وضاحتی نوٹس

- G بنیادی امیونائزیشن (4 خوراکیوں تک میں ٹیکے G1-G4)
- S امیونائزیشن کا معیار
- A امیونائزیشن کی مزید خوراک
- N کیچ اپ امیونائزیشن (ہر اس شخص کی بنیادی امیونائزیشن جسے ابھی تک ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے یا ٹیکوں کی نامکمل کورس کی تکمیل)
- ابتدائی شناختی تحقیق
- نوجوانوں پر تحقیق (12-14 سال تک کی عمر کے)، J1

